



ACTIBIRD

VITAMINAS LÍQUIDAS com aminoácidos alimento complementar

INDICAÇÃO

Complexo vitamínico com aminoácidos destinado a promover uma complementação alimentar adequada e prevenir as carências em vitaminas e aminoácidos

ESPÉCIES DE DESTINO

Aves, suínos, ruminantes e coelhos de todas as idades

PROPRIEDADES

É um concentrado de vitaminas e aminoácidos, formulado em solução oral para juntar à água de bebida. Suplementar com vitaminas aumenta a resistência orgânica durante o crescimento, em situações de stress, convalescências, etc. Também compensamos possíveis carencias vitamínicas.

Por outro lado, o hidrolizado proteico de leveduras proporciona aminoácidos de qualidade numa proporção ótima para o correcto funcionamento orgânico.

COMPOSIÇÃO

AMINOÁCIDOS por LITRO	COMPOSIÇÃO	CONSTITUINTES ANALÍTICOS e TEORES	ADITIVOS NUTRITIVOS por LITRO
Lisina 6.390mg	Propilenoglicol;	Proteína Bruta 8.80%	E-672 - Vitamina A 10.000.000UI
Histidina 1.700mg	leveduras obtidas de microorganismos	Fibra Bruta 0%	E-671 - Vitamina D3 3.200.00UI
Arginina 4.400mg	Saccharomyces cerevisiae	Matéria Gorda Bruta 2.00%	E-307 - Vitamina E* 80mg
Ácido Aspártico 9.343mg	Sorbitol;	Cinzas Totais 0.35%	Ácido Nicotínico 4.000mg
Treonina 4.300mg	Fosfato Dissódico;	Fósforo 0%	Vitamina B1 5.000mg
Serina 5.400mg	Fosfato Dissódico;	Cálcio 0%	Vitamina B2 300mg
Ácido Glutâmico 12.600mg	Cloreto de Sódio	Sódio 0.04%	Vitamina B6 3.000mg
Protina 4.100mg		Lisina 1.60%	Vitamina B12 24mg
Glicina 4.600mg		Metionina 1.60%	Vitamina K3 5.000mg
Alanina 5.300mg		Teor de Humidade 86.0%	Pantotenato de Cálcio 8.000mg
Cistina 1.200mg			Excipiente q.b.p 1.000ml
Metionina 9.500mg			
Valina 5.800mg			
Isoleucina 3.800mg			
Leucina 6.400mg			
Tirosina 2.500mg			
Fenilalanina 3.900mg			

*alfatocoferol acetato

DOSAGEM

Frangos, perús, poedeiras, bovinos, ovinos e equinos

5ml por 10 litros de água de bebida durante 5 a 7 dias

Suínos, caprinos e coelhos:

2ml por 10 litros de água de bebida durante 5 a 7 dias

ADMINISTRAÇÃO

Solução oral para administrar na água de bebida durante 5 a 7 dias. Não usar em simultâneo com vitamina D2. Mudar a água de bebida todos os dias.

CONSERVAÇÃO

Conservar em local abrigado da humidade e incidência de raios solares. A alteração de cor não altera a qualidade do produto.